



## Espaço Sinta-se Bem

Dr. Mauricio Guilherme de Campos Viggiano  
Diretor Técnico  
CRM/GO – 930

[www.unimedgoiania.coop.br](http://www.unimedgoiania.coop.br)  
Rua 15A, nº 212  
74.070-080 St. Aeroporto, Goiânia - GO  
T (62) 3524-6800



### PNEUMOCÓCCICA 23 - VALENTE - VPP23

#### O que previne

Doenças causadas por 23 tipos de pneumococos.

#### Do que é feita

Trata-se de vacina inativada, portanto, não tem como causar a doença.

É composta de partículas purificadas (polissacarídeos) das cápsulas de 23 tipos de *Streptococcus pneumoniae* (pneumococo), cloreto de sódio, água para injeção e fenol.

#### Indicação

- Para crianças acima de 2 anos, adolescentes e adultos que tenham algum problema de saúde que aumenta o risco para doença pneumocócica (diabetes, doenças cardíacas e respiratórias graves; sem baço ou com o funcionamento comprometido desse órgão; com problemas de imunidade, entre outras condições).
- Para pessoas a partir de 60 anos deve ser aplicada de rotina.
- Não é recomendada como rotina para crianças, adolescentes e adultos saudáveis.

#### Contraindicação

Crianças, adolescentes e adultos que apresentaram anafilaxia causada por algum componente ou dose anterior da vacina.

#### Esquemas de doses

- Recomenda-se a combinação da VPP23 com a VPC13. Idealmente, deve-se iniciar o esquema com a aplicação de vacina pneumocócica conjugada (VPC10 ou VPC13) – veja as indicações de cada uma – e aplicar uma dose da VPP23 seis a doze meses depois da dose da vacina conjugada, e outra cinco anos após a primeira dose de VPP23.
- Na maioria das vezes não se recomenda aplicar mais de duas doses de VPP23.

#### Via de aplicação

Intramuscular.

Cuidados antes, durante e após a vacinação:

- Não são necessários cuidados especiais antes da vacinação.
- Em caso de febre, deve-se adiar a vacinação até que ocorra a melhora.



## Espaço Sinta-se Bem

Dr. Mauricio Guilherme de  
Campos Viggiano  
Diretor Técnico  
CRM/GO - 930

[www.unimedgoiania.coop.br](http://www.unimedgoiania.coop.br)  
Rua 15A, nº 212  
74.070-080 St. Aeroporto, Goiânia - GO  
T (62) 3524-6800



- Compressas frias aliviam a reação no local da aplicação.
- Qualquer sintoma grave e/ou inesperado após a vacinação deve ser notificado ao serviço que a realizou.
- Sintomas de eventos adversos graves ou persistentes, que se prolongam por mais de 24 a 72 horas (dependendo do sintoma), devem ser investigados para verificação de outras causas.

### Efeitos e eventos adversos

- As reações adversas mais frequentes, que ocorrem com mais de 10% dos vacinados, são: dor no local da aplicação (60,0%), inchaço ou endurecimento (20,3%); vermelhidão (em 16,4%); dor de cabeça (17,6%); cansaço (13,2%) e dor muscular (11,9%). Reações locais mais intensas, com inchaço de todo braço, chegando até o cotovelo, hematoma e manchas vermelhas podem ocorrer em menos de 10% dos vacinados.
- Todas as reações adversas são mais frequentes após revacinação com períodos de tempo curtos. Acredita-se que estejam relacionadas com a presença de grande quantidade de anticorpos no organismo.

### Onde pode ser encontrada

- Em clínicas privadas de vacinação.
- Nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Cries), para pessoas a partir de 2 anos de idade, adolescentes e adultos com condições de saúde especiais que as tornam pensadas a ter doença grave causada pelo pneumococo.