



## Espaço Sinta-se Bem

Dr. Mauricio Guilherme de Campos Viggiano  
Diretor Técnico  
CRM/GO - 930

[www.unimedgoiania.coop.br](http://www.unimedgoiania.coop.br)  
Rua 15A, nº 212  
74.070-080 St. Aeroporto, Goiânia - GO  
T (62) 3524-6800



## FEBRE TIFOÍDE

### O que previne

Febre tifoide.

### Do que é feita

Trata-se de vacina inativada, portanto, não tem como causar a doença.

É composta por polissacarídeos da cápsula da bactéria (*Salmonella typhi*), fenol, cloreto de sódio, fosfato dissódico diidratado, fosfato monossódico diidratado e água para injeção.

### Indicação

- Crianças a partir de 2 anos de idade, adolescentes e adultos que viajam para áreas de alta incidência da doença, em situações específicas de longa permanência e após análise médica criteriosa.
- Profissionais que lidam com águas contaminadas e dejetos.

### Contraindicação

Hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da vacina.

### Esquema de doses

Uma dose. A vacina confere proteção por três anos, de modo que a revacinação pode ser recomendada após este período, se o risco de adoecimento persistir ou retornar.

### Via de aplicação

Intramuscular ou subcutânea.

### Cuidados antes, durante e após a vacinação

- Em caso de febre recomenda-se adiar a vacinação até a melhora.
- Não são necessários cuidados especiais antes da vacinação.
- Compressas frias aliviam a reação no local da aplicação. Em casos mais intensos, pode ser usada medicação para dor, sob recomendação médica.
- Qualquer sintoma grave e/ou inesperado após a vacinação deve ser notificado ao serviço que a realizou.
- Sintomas de eventos adversos persistentes, que se prolongam por mais de 72 horas (dependendo do sintoma), devem ser investigados para verificação de outras causas.



## Espaço Sinta-se Bem

Dr. Mauricio Guilherme de  
Campos Viggiano  
Diretor Técnico  
CRM/GO - 930

[www.unimedgoiania.coop.br](http://www.unimedgoiania.coop.br)  
Rua 15A, nº 212  
74.070-080 St. Aeroporto, Goiânia - GO  
T (62) 3524-6800



### Efeitos e eventos adversos

A vacina febre tifoide causa poucas reações, sendo as mais frequentes relacionadas com o local da aplicação: dor, em 3,6% a 9,4% dos vacinados; vermelhidão, em 2,4% a 5,4%; inchaço, em 1,7% a 1,8%. Outras possíveis reações: febre, em 1,5% a 16,2%; dor de cabeça, em 10% a 7,8%; mal-estar, em 0,9% a 4%; náuseas, em 2,1% a 5%; e coceira, em 1,7% a 1,8%.

### Onde pode ser encontrada

Em Clínicas privadas de vacinação e centros de atendimento ao viajante.