

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO		
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A PARTIR DE 60 ANOS			
BCG	Ao Nascer																								
Hepatite B	1ª dose	2ª dose					3ª dose																		
Triplice Bacteriana (dTpa ou DTPw)		1ª dose	2ª dose	3ª dose								Reforço		Reforço							Reforço com 9 anos e a cada 10 anos				
Heamophilus Influenzae tipo B		1ª dose	2ª dose	3ª dose								Reforço													
Poliomelite		1ª dose	2ª dose	3ª dose								Reforço		Reforço											
Rotavirus		1ª dose	2ª dose	3ª dose							CONTRAINDICADA														
Pneumococica Conjugadas 13 valente		1ª dose	2ª dose	3ª dose								Reforço											Uma dose		
Meningococica Conjugada ACWY			1ª dose	2ª dose								Reforço					Reforço				Reforço				
Meningococica B			1ª dose	2ª dose								Reforço			Duas doses com intervalo de 2 meses										
Influenza								DOSE ANUAL - 2 DOSES NA PRIMOVACINAÇÃO ANTES DOS 9 ANOS DE IDADE																	
Febre Amarela									1ª dose							2ª dose									
Hepatite A										1ª dose		2ª dose													
Triplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola)										1ª dose		2ª dose													
Varicela (Catapora)										1ª dose		2ª dose													
HPV 4V																			3 doses com esquema (0-2-6)						
Pneumococica 23 valente																							Duas doses com intervalo de 5 anos		
Herpes Zoster																							Uma dose		
Dengue	CONTRAINDICADA																	Recomendada para pessoas soropositiva para dengue de 9 a 45 anos: Três doses 0-6-12 meses			CONTRAINDICADA				